


نجاح أول عملية جراحية بالحبـل الشوكي لطفـل رضـيع في مصر



نـجح فـريق طـبـي بـمـسـتـشـفى أبـوقـير العـام فـي الإسـكـنـدريـة بـمـصر، فـي إجـراء عـمـليـة جـراحـيـة لـتـصـويـب عـيب خـلـقي بـالـحـبـل الشـوكـي لـرـضـيـع يـبـلـغ مـن العـمـر يـومـا وـاحـدا.

وقـالـت الـدكـتـورـة "دعـاء حـمـودـة"، مـديـر مـسـتـشـفى أبـوقـير العـام، إن "المـسـتـشـفى اسـتـقـبـل رـضـيـعـا يـبـلـغ مـن العـمـر يـومـا وـاحـدا مـصـاب بـعـيب خـلـقي فـي الحـبـل الشـوكـي "مـرض الصـلب المـشـفـوق" (defect tube Neural بالشـكل النـخـاعي والحـبـل الفـقـري العـمـود يـتـكوـن لا عـنـدما يـحـدث خـلـقي عـيب وـهو (meningocoele repair الصحيح.

وأضـافـت الـدكـتـورـة دعـاء حـمـودـة أن العـمـليـة اسـتـمـرت قـرابة "4" سـاعـات.

وتمنـت مـديـرة المـسـتـشـفى جـهـود الفـريق الطـبـي القـائم عـلى العـمـليـة الجـراحـيـة.

ومـرض "الصـلب المـشـفـوق" أو "السـنـسـنة المـشـفـوقـة" نـوع مـن عـيـوب الأـنـبـوب العـصـبي الـذي يـعـد بـنيـة بـالـجـنـين

النامي تصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بهما ، ويتكون الأنبوب العصبي عادة في وقت مبكر من الحمل ، ويغلق في اليوم الثامن والعشرين بعد الإخصاب.

وفي حالة الأطفال الذين لديهم السنسنة المشقوقة ، لا يغلق جزء من الأنبوب العصبي أو لا يتطور بالشكل الصحيح ، ما يسبب مشكلات في الحبل النخاعي وفي عظام العمود الفقري.